

Assunto: Vacina contra a gripe - vacinação de crianças com idade entre os 6 e os 35 meses – com a vacina Trivalente para a época 2013/2014

Para: Todos os Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos das Unidades de Saúde integradas no Sistema Regional de Saúde (SRS)

Sobre o assunto em epígrafe e na sequência da informação que nos foi facultada pela Direção-Geral da Saúde, o IASAÚDE, IP-RAM vem pela presente circular divulgar informação complementar à sua Circular Normativa n.º S 31 de 30-09-2013, sendo que para explicitação complementar comunica que:

- a vacina Istivac infantil (0,25mL) não foi comercializada nesta época, pelo que não existe nenhuma vacina com dose específica para as crianças dos 6 aos 35 meses de idade;
- todas as vacinas contra a gripe disponíveis na época 2013/2014 têm uma dose de 0,5mL e estão licenciadas **para administração a partir dos 6 meses de idade:**
 - **Istivac** (vacinação gratuita aos grupos definidos - SRS);
 - **Fluarix** (vacinação gratuita aos grupos definidos - SRS e disponível nas farmácias);
 - **Influvac** (disponível nas farmácias).

A Circular Normativa supra referida refere no ponto “7. Modo de Administração”, nomeadamente na **posologia**:

Dose indicada, de acordo com a idade:

- crianças dos 6 aos 35 meses: 0,25mL;
- crianças a partir dos 36 meses de idade e adultos: 0,5mL.

Os RCM (ponto 6.6) destas vacinas (Istivac®, Fluarix® e Influvac 2013/2014) têm informação sobre o modo de administração de uma dose de 0,25 mL, pelo que transcreve-se a informação dos folhetos informativos que acompanham as vacinas sobre a posologia para vacinação de crianças entre os 6 e os 36 meses:

Folheto informativo Istivac¹

Crianças com idades compreendidas entre os 6 meses e os 35 meses: os dados clínicos são limitados. Podem ser administradas doses de 0,25 ml ou de 0,5 ml. A posologia administrada deve estar de acordo com as recomendações nacionais existentes.

¹ http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=4709&tipo_doc=rcm

Em crianças, quando é indicada uma dose de 0,25 ml, empurrar o êmbolo da seringa até ao ponto exato da marca para que seja eliminado metade do volume. O restante volume deverá ser administrado.

Folheto informativo Fluarix²:

Em crianças dos 6 meses aos 35 meses pode ser administrada uma dose de 0,25 ml ou uma dose de 0,5 ml, de acordo com as recomendações nacionais existentes.

Instruções de administração de 0,25 ml de vacina para administração em crianças dos 6 meses aos 35 meses de idade: Quando está indicada uma dose de 0,25 ml, deve segurar-se a seringa pré-cheia em posição vertical e eliminar metade do volume, até o êmbolo atingir a linha de marcação impressa na seringa. Para as seringas sem linha de marcação, a figura 1 está concebida para facilitar a utilização de uma dosagem de 0,25 ml. Alinhar a seringa com a figura de modo a que o bordo superior da seringa corresponda à seta superior. Empurrar o êmbolo até atingir a seta inferior. O volume de 0,25 ml remanescente, na seringa, deve ser administrado.

Folheto informativo Influvac3

Crianças com 36 meses ou mais recebem uma dose de 0,5 ml. Crianças dos 6 aos 35 meses de idade podem receber uma dose de 0,25 ml ou uma dose de 0,5 ml de acordo com as recomendações nacionais existentes

Para administração de uma dose de 0,25 ml a partir de uma dose única de 0,5 ml da seringa (apenas para uso pediátrico): Empurrar o stopper frontal de borracha do êmbolo, exatamente até ao rebordo superior da câmara de derivação (o anel de polipropileno serrilhado); um volume de 0,25 ml da vacina permanece na seringa, adequado para administração.

A Presidente do Conselho Diretivo



Ana Nunes

² http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=3528&tipo_doc=fi

³ http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=4504&tipo_doc=fi