

**Assunto: Alerta de Saúde Pública n.º 2/2015
– Botulismo em consumidores de drogas
injetáveis**

Para: Unidade de Tratamento da Toxicodependência (SESARAM, E.P.E), Serviços de Urgência (SESARAM, E.P.E), Unidades Privadas de Saúde com atendimento urgente, Autoridades de Saúde


O IASAÚDE, IP-RAM através do presente *ALERTA DE SAÚDE PÚBLICA* reúne a informação mais recente sobre casos de **botulismo em consumidores de drogas injectáveis** a nível internacional que podem ter implicações para a Região. A investigação epidemiológica aponta para a possibilidade de transmissão através de ferimentos no local de injecção, embora também possa ocorrer através de possíveis úlceras na mucosa nasal nos utilizadores de drogas por esta via como a cocaína.

**Botulismo em consumidores de drogas injectáveis - Atualização da situação mundial
em fevereiro de 2015**

| Regiões e Países com casos | N.º de casos |
|-------------------------------------|--------------|
| Noruega (Oslo) | 6 |
| Escócia (Greater Glasgow and Clyde) | 7 |
| MUNDO | 13 |

Nota: O n.º de casos reporta-se ao acumulado no período de dezembro de 2014 a 7 de fevereiro de 2015.
Fonte: CDTR Week 6, 1-7 February 2015, ECDC.

A Presidente do Conselho Diretivo



Ana Nunes


Anexo:

- Mapa-mundo de ocorrência de casos (acumulados) de botulismo em consumidores de drogas injetáveis February 2015.

DSPAG – AC/MB

Países e territórios com ocorrência de casos (acumulados) de Botulismo em consumidores de drogas injetáveis

February 2015



Legenda
■ Ausência
■ Presença

Mapa com a localização dos países com casos de Botulismo em consumidores de drogas injetáveis.

Fonte das séries de mapas-mundo de doenças:
- ProMed-mail;
- ECDC (CDTR);
- CDC.

© IASaúde, IP-RAM
Série de mapas de alerta de saúde pública.
Referência: BT1_022015